

Акарицидные средства, разрешенные к применению на приусадебных, дачных и садовых участках

Широкое распространение на территории Костромской области иксодовых клещей, которые бывают одновременно заражены возбудителями клещевого вирусного энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза, гранулоцитарного анаплазмоза и других опасных инфекций, доказывает, что противоклещевые (акарицидные) наземные обработки, направленные на предотвращение присасывания клещей к людям, остаются важной и необходимой частью комплекса профилактических мероприятий.

Проводить акарицидные обработки необходимо ежегодно, в первую очередь в зонах высокого риска заражения людей клещевыми инфекциями, особенно на территориях пребывания детских контингентов.

Учитывая значимость приусадебных, дачных и садовых участков, как мест вероятного массового контакта населения с клещами, ФБУН «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Роспотребнадзора рекомендует для обработки участков в настоящее время использовать следующие 6 средств:

- "Альпицид",

- "Бриз 25% э. к.",

- "Гардекс Экстрим (Gardex Extreme) Концентрат для защиты территории от клещей" (он же "Гардекс Экстрим (Gardex Extreme) концентрат для обработки территории от клещей" "Гардекс Экстрим (Gardex Extreme) концентрат для защиты дачного участка от клещей"),

- "Клещевит супер",

- "МЕДИЛИС-ципер",

- "Цифокс".

Вышеуказанные средства разрешены для применения, как дезинфекционными организациями, так и населением в быту для самостоятельной обработки участков, находящихся в личном пользовании. Средства необходимо использовать в соответствии с текстами этикеток, которые были специально разработаны для населения в ФБУН «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Роспотребнадзора.