

Алгоритм действий в случае присасывания клеща

Присосавшихся к телу клещей следует немедленно удалить!

Удаление присосавшегося клеща лучше проводить в медицинской организации: в поликлинике по месту жительства, в приемном покое больницы, в травматологическом пункте, в амбулатории, в фельдшерском пункте, в медицинском пункте предприятия или организации.

Если нет возможности немедленно обратиться в медицинскую организацию, то снимать клеща следует очень осторожно, стараясь не оторвать погруженный в кожу хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания. Чем быстрее Вы это сделаете, тем меньше шансов, что в кровь попадут опасные возбудители.

Снимать клещей лучше с использованием специальных приспособлений: "Ручка-лассо" (г. Санкт-Петербург) или "Клещеверт" (г. Пермь).

При отсутствии специальных приспособлений удалить клеща можно при помощи нитки, которую необходимо завязать вокруг хоботка клеща и вращая или покачивая, тянуть вверх.

Кроме этого можно использовать пинцет с тонкими кончиками или захватить клеща ногтями как можно ближе к коже за хоботок и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов.

Нет смысла что-либо капать на клеща и ждать когда он сам отпадет. Клещ не отпадет, а пока Вы будете ждать, он продолжит вводить в кровь возбудителей болезней.

После извлечения клеща необходимо руки тщательно вымыть с мылом. Место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством: 70% спирт, 5% йод или одеколон.

Снятого клеща следует поместить в плотно закрывающуюся емкость, поместив туда кусочек влажной ваты или ткани, и доставить в лабораторию для проведения исследования (см. «Медицинские организации Костромской области, в которых проводятся лабораторные исследования клещей на возбудителей клещевых инфекций»).

Если клещи присосались к нескольким людям, то клещей с каждого человека надо поместить в отдельную емкость, подписав фамилию пострадавшего. Клещей доставить в лабораторию как можно скорее для выполнения исследования.

В случае обнаружения в клещах возбудителей одной или нескольких инфекций необходимо с результатами анализа обратиться к врачу-инфекционисту или терапевту в поликлинике, которые дадут соответствующие рекомендации по профилактике развития заболеваний.