



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ"  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ"

## КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

«Центр развития ребёнка – Детский сад № 38» г. Костромы



### Консультация для родителей

## **АУТИЗМ: ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ**

*Расстройства аутистического спектра (РАС) влияют на мышление, восприятие, внимание, социальные навыки и поведение. У человека с РАС могут появляться сужение интересов, нарушения коммуникации и речевых способностей.*

Всемирная организация здравоохранения приводит ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы по поводу РАС (ВОЗ, 2016).

### **Что такое аутизм**

Расстройства аутистического спектра — это группа сложных расстройств развития мозга. Зонтичный термин охватывает такие состояния, как аутизм и синдром Аспергера. Для таких расстройств характерны трудности социального взаимодействия и коммуникации, а также ограниченный и повторяющийся круг интересов и занятий.

### **Насколько широко распространен аутизм**

Считается, что один ребенок из 160 детей имеет какое-либо расстройство аутистического спектра. Это усредненная оценка, которая варьируется в разных исследованиях. По некоторым недавним оценкам, показатели значительно выше.

### **Всегда ли люди с аутизмом страдают от умственной отсталости**

Уровень умственной деятельности у людей с РАС варьирует в чрезвычайно широких пределах — от тяжелого нарушения функций до превосходных невербальных когнитивных навыков. Около 50% людей с РАС страдают также от умственной отсталости.

### **Насколько рано можно распознать аутизм у ребенка?**

Распознать расстройство аутистического спектра у детей до 12 месяцев сложно, но в возрасте двух лет диагностирование обычно

возможно. Характерны задержка или временный регресс в развитии речи и социальных навыков и повторяющиеся стереотипные модели поведения (стереотипии — эпизоды бесцельно повторяющихся действий, движений, слов или отдельных звуков).

**Существуют несколько признаков, которые могут свидетельствовать о РАС. Близкие люди должны обратиться к специалистам, если:**

- *ребенок не улыбается, не проявляет радости в возрасте 6 месяцев и более;*
- *не повторяет за взрослыми звуки, не улыбается в ответ на улыбку;*
- *у него нет эмоциональной мимики в возрасте от 9 месяцев;*
- *нет лепета в возрасте 12 месяцев;*
- *нет обычных жестов: не показывает на что-то пальцем, не тянет руку, чтобы дотянуться или помахать на прощание, в возрасте 12 месяцев.*
- *нет никаких слов в возрасте 16 месяцев.*
- *нет осмысленных фраз из двух слов (без подражания или повторения) в возрасте 24 месяцев.*
- *нет реакции на обращение по имени в возрасте 10 месяцев.*
- *были, но «пропали» речь (или лепет) или социальные навыки в любом возрасте.*

### **Как развиваются дети с РАС**

Характерные особенности поведения малыша при угрозе формирования синдрома детского аутизма можно обнаружить, если ребенок пытается дозировать эмоциональный контакт, не проявляет активность и инициативу в непосредственном общении.

### **Слабый эмоциональный контакт**

У такого ребенка бывает недостаточно развернут и выражен «комплекс оживления», он не исследует материнское лицо, не имитирует его выражение, не ловит, не отслеживает и не предвосхищает взгляд и эмоциональную реакцию взрослого.

Малыш редко адресует взрослому вокализации (различные звуки), направленный взгляд, а затем указательные жесты и первые вербальные обращения. Ребенок не стремится поделиться с близкими

своим удовольстви-ем и другими ощущениями. Он не всегда или слабо откликается на обра-щение, эмоциональную оценку взрослого.

Таким детям тяжело дается физическое расставание с матерью. Именно в это время становится особенно заметным, что ребенок «не слышит» обращения, не реагирует на соб-ственное имя, не ощущает реальную опас-ность.

### **Особенности деятельности и речи**

В период от полутора до двух с полови-ной лет малышу становится сложнее направлять и удерживать внимание на задаче его деятельности в данный момент. У него не развивают-ся подражание и исследовательская актив-ность, не усложняются манипуляции с игрушками.

Становятся все более выражен-ными отставание и своеобразие речевого развития, не направленное на коммуни-кацию; закрепляются характерные стерео-типные движения и действия с предметами.

Появляются и усиливаются тревожность, страхи, дискомфортные состояния, все бо-лее заметны трудности принятия всего но-вого; при этом малыш часто не может пожа-ловаться, принять помощь близких.

### **Сложности адаптации**

О нарушениях в развитии способности к адаптации можно судить по ранней фиксации меха-нических средств аутостимуляции (самораз-дражения, двигательных разрядов и стерео-типной манипуляции предметами), которые и в дальнейшем используются ребенком как для уменьшения дискомфорта, так и для возможности пережить сильное позитив-ное впечатление.

Такая особая сосредоточенность ре-бенка на избирательных сенсорных впечат-лениях начинает мешать развитию ориентации на близкого человека, и без того исходно слабой.

### **Как проявляются РАС**

*Проблемы с социальным взаимодействием.* Ребенок избегает смотреть в глаза, не умеет показать, что ему нужно (отсутствует указательный жест, вместо него используется рука взрослого), не хочет делиться, не приветствует знакомых, не участвует в коллективных играх.

*Однообразные, повторяющиеся интересы, поведение, ритуалы.* Если идти в магазин, то одной дорогой. Истерика при попытке сменить маршрут.

*Игры неигровыми предметами* (например, между куклой и ключами выбирает ключи). Однотипные «упорядочивающие» игры: расстановка предметов по размеру, цвету.

*Главенствующая тема интересов.* Допустим, это поезда. Тогда школьник будет знать мельчайшие детали про их строение и работу, не умея при этом удержать в голове базовую информацию о мире (например, страна проживания, профессия папы).

*Нарушения в общении.* Ребенок мало разговаривает, не пытается заговорить со сверстниками на площадке. В школе не отвечает на вопрос учителя, даже если знает ответ, или отделяется односложным «угу». Испытывает сильный дискомфорт при необходимости ответить на звонок, позвонить, задать вопрос продавцу в супермаркете.

### **Другие признаки**

- Эхолалия (бесмысленное повторение слов за собеседником).
- Снижение чувствительности к боли.
- Стереотипии (регулярно повторяющиеся движения, звуки).
- Самостимуляция в различных формах: накручивание волос на палец, кусание себя, выкрики, ковыряние в носу, верчение брелока.
- Самоповреждение; снижение чувства самосохранения; невозможность понимать социальные сигналы.
- Непонимание переносного смысла, иронии, намеков.
- Невозможность изменять свое поведение в зависимости от ситуации.
- Избирательность в еде, проблемы с приемом пищи.
- Сложности с засыпанием.
- Приступы агрессии, гнева.
- Гиперактивность. Снижение концентрации.
- Неумение проявить эмпатию, понять чувства другого человека по тону, выражению лица, позе.

Источник:

Портал «Аутизм-инфо»

Текст: Ксения Вовненко, кандидат психологических наук, доцент МПГУ