

СКОРО В ШКОЛУ. С ПОДГОТОВЛЕННЫМ ИММУНИТЕТОМ!

Когда ребенок впервые идет в школу, его там ждет не только увлекательный мир знаний, но и невидимые опасности - возбудители инфекций.

Приходя в первый класс, после летний каникул дети попадают в новую, необычную для них среду, подвергаются высокой интеллектуальной и эмоциональной нагрузке, испытывают стресс и проходят сложный период адаптации, все это ослабляет иммунитет. В этот период дети особенно подвержены риску развития инфекционных заболеваний и нуждаются в защите. Защититься от них помогает вакцинация.

Национальный календарь профилактических прививок, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 №1122н предусматривает вакцинацию против двенадцати инфекций (гепатит В, туберкулез, пневмококковая инфекция, дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция, корь, краснуха, эпидемический паротит, грипп). Большинство прививок нужно сделать до того, как ребенок пойдет в детский сад и школу.

Национальным календарем профилактических прививок определены категории и возраст, подлежащих обязательной вакцинации, наименование профилактической прививки и порядок их проведения.

Получить консультацию о порядке и схеме проведения иммунизации можно в поликлинике по месту жительства.

К началу первого класса ребенок успевает получить все прививки в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (многие не по одному разу). В школе новых прививок уже не будет - только ревакцинации (повторное введение вакцин).

Ревакцинация помогает усилить защиту и сформировать более надежный иммунитет.

Если ребенок прививался с рождения по календарю прививок, то к 6-7 летнему возрасту у него должны быть следующие (обязательные) прививки:

- БЦЖ (туберкулез) - 1 прививка
- Пневмококковая инфекция - 3 прививки
- Гемофильная инфекция тип b - 3 прививки
- Гепатит В - 3 прививки
- Полиомиелит - 5 прививок
- Коклюш, дифтерия, столбняк - 4 прививки
- Корь, эпидемический паротит, краснуха - 1 прививка
- Грипп - ежегодно, с 6 месяцев жизни ребенка.

Если ребенок прививался с рождения по календарю прививок, то в 6-7 летнем возрасте ему предстоит сделать следующие прививки:

- в 6 лет - первая ревакцинация (RV1) против кори, краснухи, эпидемического паротита;
- в 6-7 лет - вторая ревакцинация (RV2) против дифтерии, столбняка (вакцина АДС-М) или вторая ревакцинация (RV2) против коклюша, дифтерии, столбняка (вакцина «Адасель»);

- в 6 лет - третья ревакцинация (RV3) против полиомиелита, которая вводится орально (через рот). **Не есть, не пить час после вакцинации;**
- если проба Манту дважды показала себя отрицательно, то показана ревакцинация (RV) против туберкулеза - БЦЖ в 6-7 лет.

Бывают ситуации, когда до школы ребенку успели сделать не все прививки или не сделали ни одной. Причины для этого бывают разные. Это может быть медицинский отвод по состоянию здоровья или позиция родителей.

Что делать, если вы решили сделать до школы все прививки ребенку в 5-6 лет? Поможет догоняющая иммунизация.

Необходимо посетить врача-педиатра для составления индивидуального плана вакцинации ребенка.

Следует помнить, что почти все инфекции, против которых существует вакцинация в Национальном календаре профилактических прививок, передаются от человека к человеку. Если большинство населения привито, вследствие формирования коллективного иммунитета возбудителям инфекции становится сложно распространяться дальше. Поэтому следует помнить, что прививки - не личное дело каждого, а наша общая ответственность.

Безосновательный отказ родителей от вакцинации своего ребенка ставит под угрозу здоровье не только своего ребенка, но и других детей.

Риски, связанные с инфекциями, против которых есть прививки, несоизмеримо выше, чем минимально возможные побочные эффекты от вакцинации. Они встречаются в одном и менее случаев на миллион вакцинированных.

Берегите себя и своих детей и будьте здоровы!

Информация подготовлена с использованием материалов ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора.